équi-pâture

Newsletter - Septembre 2016

« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval et pratiquer une vermifugation raisonnée

Actualité du programme Equi-pâture

Au cours de l'été, la période de sécheresse sévissant sur nos trois régions étudiées a obligé les exploitations pilotes à affourager les chevaux précocement. Cependant certains animaux, notamment les chevaux à l'entretien dont l'état corporel était satisfaisant (note > 3,5) n'ont pas reçu de complément en fourrage.

La deuxième vague de coproscopies en août a mené à la vermifugation de la moitié des chevaux adultes, avec du pyrantel.

Retrouvez dans cette lettre des fiches techniques, l'expérience du Domaine de Gauchoux sur l'utilisation de piquets de clôtures en PVC recyclé ainsi que les résultats de coproscopies de l'été (au dos).

Conduite des pâtures

Clôtures pour chevaux

La clôture a pour fonction de maintenir en sécurité les équidés dans l'espace prévu. La robustesse de la clôture permanente, le montage de la clôture électrique ainsi que les préconisations de hauteurs de fils sont abordés dans cette fiche. En savoir plus

Nourrir 100 % à l'herbe, c'est possible et c'est économique

L'aliment le moins cher est l'herbe, qu'elle soit verte au pâturage ou sous forme de foin et d'enrubanné. Le coût de production, ainsi que la valeur alimentaire de l'herbe sont souvent méconnus. Retrouvez ici le coût d'alimentation à l'année d'un cheval nourri 100 % à l'herbe . En savoir plus

Conduite des chevaux

Estimer le poids du cheval

Estimer le poids du cheval permet d'établir la ration alimentaire, suivre la croissance des poulains et adapter les doses de traitements anti-parasitaires. A partir d'équations barymétriques établies, il est possible d'estimer le poids d'un cheval en réalisant des mesures de hauteur au garrot et de périmètre thoracique. En savoir plus

Gestion de l'environnement pour le contrôle du parasitisme

90 % des éléments parasitaires (œufs, larves ou parasites adultes) se trouvent dans l'environnement (boxes, pâture, paddocks) contre seulement 10 % dans l'organisme des chevaux. Les mesures sanitaires prises pour réduire la contamination du milieu extérieur ont donc un intérêt majeur, bien supérieur à celui de la vermifugation. En savoir plus

Dans la prochaine newsletter d'octobre : l'entretien des pâtures à l'automne, interpréter une analyse de sol, l'incidence de la qualité du foin sur le coût de la ration, les strongles.

Contact et Inscription à la newsletter : equipature@ifce.fr

Pour en savoir plus : équi-paedia l'encyclopédie pratique du cheval

ifce institut français du cheval et de l'équitation

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRES D'AGRICULTURE

RÉGION NORMANDIE

l'Europe s'engage en Basse-Normandie avec le FEADER

FCC Fédération Nationale des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France

Le programme **Equi-pâture** 2016-2017 s'appuie sur le suivi de 12 exploitations dans 3 régions. Ces structures volontaires dites « pilotes » ont été choisies afin d'illustrer la diversité des activités agricoles équines et des spécificités régionales. Voici la présentation des résultats de coproscopies de l'été. Vous trouverez aussi l'expérience du Domaine de Gauchoux sur l'utilisation de piquets de clôture en PVC recyclé.



Résultats des coproscopies présentés par Marie Delerue, vétérinaire Ifce responsable du suivi sanitaire – Equipâture :

En Normandie et dans le Centre, 111 chevaux ont reçu un examen coproscopique.

- 46 % ont été diagnostiqués faibles excréteurs (< 200 opg*),
- 15 % excréteurs modérés (200 à 500 opg)
- 39% forts excréteurs (> 500 opg).

Environ 50% des chevaux n'ont donc pas eu besoin d'être vermifugés cet été. Ces résultats sont cependant très variables d'une exploitation à l'autre : le pourcentage de forts excréteurs variant de 22% à 73%.

Ces forts excréteurs excrètent 89% de la totalité des œufs excrétés contre 11% pour les faibles et modérés. Leur vermifugation a donc un impact significatif sur la contamination des pâtures.

Un test de résistance a été mené dans une exploitation normande. Ce test, qui compare les résultats des coprocopies avant et après vermifugation au pyrantel, a montré une résistance des petits strongles vis à vis du pyrantel en cours de développement.

*opg : nombre d'oeufs par gramme de crottin

Domaine de Gauchoux,

« Des piquets de clôture innovants en PVC recyclé »

Le domaine de Gauchoux a innové dans le pâturage tournant avec des piquets de clôtures en PVC recyclé.

Il existe deux types de piquets : des piquets fixes (PVC de 40mm de diamètre) d'une hauteur 1m50 et des piquets mobiles dits « nomades » plus petits.

Les piquets PVC supportent la tension du fil électrique et sont utilisés pour les barrières et les angles, les piquets nomades ne servent que de « raidisseurs » en ligne droite.

Ces piquets ne nécessitent pas l'usage d'isolateurs car leur matière est isolante et ils sont pourvus d'encoches. La pose de ces clôtures fixes ou semi fixes est facile avec un piquet tous les 15 à 20 m qui peuvent se réutiliser à l'infini car ils sont imputrescibles et traités contre les UV.

Ils sont adaptés à tous les types de fils (hormis les fils high tensile) y compris du ruban plat. Plusieurs hauteurs de fils sont prévues.

Au domaine de Gauchoux, pour des chevaux d'instruction, l'utilisation d'un seul fil bien électrifié apporte satisfaction.

Poteaux de clôture en PVC recyclé

Auteurs : IFCE, Chambres d'agriculture
Septembre 2016
Crédits photos : DDR-IFCE