



8è journée du réseau REFErences - 23 avril 2015


CONTEXTE de la STATION EXPERIMENTALE


- Exploitation agricole 130 ha 110 SAU
 - Prairies temporaires longues 80% de la STH
 - Prairies permanentes 20% de la STH
 - 10 ha de culture maïs et orge
- Produisant et hébergeant de 150 à 200 chevaux
 - 80 juments 30 gestantes chaque année, mise à la reproduction 1 année sur 2
 - Toutes les générations de 0 à 3 ans de 25 à 30 individus
- Travaillant pour la Recherche le Développement et l'Innovation
 - dizaine de programmes scientifiques validés par le Conseil Scientifique de l'IFCE chaque année


Réseau Économique de la Filière Équine

















8è journée du réseau REFErences – 23 avril 2015


2010


Pâturage tournant


Mise en place

- •Optimiser le découpage parcellaire par rapport aux points d'eau
- •Connaitre la « qualité » de ses parcelles
- •Elaborer le planning pâturage
 - Avec les contraintes de constitution des lots
 - entre 6 et 8 avec des besoins physiologiques différents
 - Nombre (chargement)
 - Contraintes des protocoles et de la facilité de manipulation
 - Savoir le faire évoluer au cours de la saison

Réseau Économique de la Filière Équine











				mise en place du PT
		2000	2006	2010
Apport NPK	<u>organique</u> épandage fumier	non	non	oui
	<u>minéral</u>	120 Unités N	30 Unités Nou 60 sur parcelles de fauche	0 ou 30 Unités N si besoin
Amendement	Chaux VIVE	oui	non	si besoin
	Marne	non	oui	si besoin
coûts de fertilisation		25000EHT	16000EHT	8000 EHT en 2015
Gestion des refus	présence de refus	nombreux	très présentes	rare homogénéisatior du couvert
	broyage refus	systématique	fréquent	uniquement si RUME
valorisation des surfaces				augmentation des surfaces de fauche si herbes devancent





Pâturage tournant Points de vigilance → Contrôle quotidien de l'électrification des clôtures → Anticipation des changements de sous-parcelles - Ne pas mettre les animaux dans de l'herbe trop haute (supérieur à 30cm) → herbe de moins bonne qualité & gaspillage - Eviter le sur-pâturage (inférieur à 5cm) → pénalise la repousse de l'herbe → Ne pas hésiter à faucher (optimisation de la production fourragère)

